

GEBRAUCHSINFORMATION
Lapimed RHD, Injektionssuspension für Kaninchen.



1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS

Zulassungsinhaber: Merial GmbH, Am Söldnermoos 6, D-85399 Hallbergmoos

Hersteller: Merial Laboratoire Porte des Alpes, 99 route de l'Aviation, F-69800 Saint-Priest

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lapimed RHD, Injektionssuspension für Kaninchen.

3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Dosis zu 0,5 ml Impfstoff enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Inaktiviertes RHD-Virus, Stamm AG88, mind. 1 PD₉₀ *
(Wirtsgewebe: Kaninchen)

* Protektive Dosis 90 %

Adjuvans:

Aluminiumhydroxid ad 0,35 mg Al⁺⁺⁺-Ionen

Thiomersal (als Konservierungsmittel).....max. 0,04 mg

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Aktive Immunisierung junger Mastkaninchen und von Zuchtkaninchen, um klinische Erkrankungen und Mortalität durch RHD (rabbit haemorrhagic disease) zu verhindern.

Beginn der Immunität: 7 Tage nach Impfung.
Dauer der Immunität: ein Jahr.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei kranken sowie mit Ekto- oder Endoparasiten befallenen Tieren.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei geimpften Tieren feststellen, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART

Kaninchen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART DER ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln, bis der Bodensatz vollständig resuspendiert ist.
Eine Dosis zu 0,5 ml wird subkutan entsprechend dem folgenden Impfplan verabreicht:

Zuchtkaninchen

Erstimpfung ab der 8. Lebenswoche.
Wiederholungsimpfungen in jährlichem Abstand.

Bei starkem Infektionsdruck:

Erstimpfung ab dem Alter von 4 Wochen.
Wiederholungsimpfungen: 4 bis 6 Wochen nach der Erstimpfung, danach jährlich.

Mastkaninchen

Eine Injektion ab dem Alter von 4 Wochen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Nur gesunde Tiere impfen.
Unter Einhaltung der üblichen aseptischen Bedingungen verabreichen.
Steriles Impfbesteck verwenden.
Für jedes Kaninchen ist eine neue Kanüle zu verwenden.

10. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Gekühlt lagern und transportieren (2 °C – 8 °C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 8 Stunden.

Sie dürfen den Impfstoff nach dem auf dem Behältnis und auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Es liegen keine Informationen zur Unschädlichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffes bei gleichzeitiger Anwendung eines anderen veterinärmedizinischen Produktes vor. Ob der Impfstoff vor oder nach Verabreichung eines anderen veterinärmedizinischen Produktes verwendet werden sollte, muss daher fallweise entschieden werden.

Nicht mit anderen Impfstoffen, immunologischen Produkten oder Tierarzneimitteln mischen.

Die Verabreichung einer Überdosis führt zu keinen anderen als den unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen unerwünschten Arzneimittelwirkungen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIAL, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER GEBRAUCHSINFORMATION

Juli 2010

15. WEITERE ANGABEN

Handelsformen:

Packung mit 1 Glasflasche zu 1 ml (2 Dosen),

Packung mit 1 Glasflasche zu 5 ml (10 Dosen),

Packung mit 1 Glasflasche zu 25 ml (50 Dosen).

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Verschreibungspflichtig