

**GEBRAUCHSINFORMATION**  
**Eurican Merilym®**  
Injektionssuspension für Hunde



**1. NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST**

Zulassungsinhaber:

Deutschland:

Merial GmbH, Am Söldnermoos 6, D-85399 Hallbergmoos

Österreich:

Merial SAS, 29 avenue Tony Garnier, F-69007 Lyon

Hersteller:

MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l'Aviation, F-69800 Saint Priest, Frankreich

**2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Eurican Merilym®

Injektionssuspension für Hunde

**3. ARZNEILICH WIRKSAME(R) BESTANDTEIL(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE**

Eine Dosis zu 1 ml Impfstoff enthält:

**Arzneilich wirksame(r) Bestandteil(e):**

*Borrelia burgdorferi sensu stricto*, inaktiviert, mind. 330 ELISA-Einheiten<sup>1</sup>

**Adjuvans**

Aluminium (als Hydroxid)

0,6 mg

<sup>1</sup> ELISA-Einheiten gemessen in Mäusen

Aussehen: opaleszent und homogen

#### **4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Bei Hunden:

Schutzimpfung gegen die durch *Borrelia burgdorferi sensu stricto* verursachte Lyme-Borreliose.

Die Impfung mit Eurican Merilym schützt Hunde gegen eine Belastungsinfektion mit *Borrelia burgdorferi sensu stricto* und bewirkt eine spezifische Serokonversion gegenüber *Borrelia burgdorferi*. Durch Testinfektionen mit infizierten Zecken wurde belegt, dass dadurch die Vermehrung des Erregers in Haut, Gelenken und Muskulatur unterbunden wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist *B.b. sensu stricto* der beim Hund pathogene Genotyp.

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Kranke sowie mit Ekto- oder Endoparasiten befallene Tiere sind nicht zu impfen.

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Ausnahmsweise können bei sensibilisierten Hunden Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die symptomatisch zu behandeln sind. In seltenen Fällen können in den ersten beiden Tagen nach der Impfung geringfügige Reaktionen, wie Appetitlosigkeit, geringgradiger Temperaturanstieg und leichte Mattigkeit, beobachtet werden.

Lokale Reaktionen an der Injektionsstelle können entweder unmittelbar nach Impfung in Form von Juckreiz oder nach 24 bis 48 Stunden als Schwellung mit einem Durchmesser bis zu etwa 5 cm auftreten, die sich im Allgemeinen innerhalb einer Woche zurückbildet.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

#### **7. ZIELTIERART(EN)**

Hunde.

#### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART DER ANWENDUNG**

Die Impfdosis beträgt 1 ml, unabhängig von Alter und Gewicht des Tieres.

**Impfplan:**

Grundimmunisierung: ab einem Alter von 12 Wochen, 2 Impfungen im Abstand von 3-5 Wochen; idealerweise im Frühjahr des 1. Impfstoffjahres.

1. Auffrischungsimpfung: nach 4-6 Monaten; idealerweise im Herbst des 1. Impfstoffjahres.

2. Auffrischungsimpfung: nach 4-6 Monaten; idealerweise im Frühjahr des 2. Impfstoffjahres.

Wiederholungsimpfungen: jeweils jährlich vor Beginn der Zeckensaison.

Dieser Impfplan sollte zum Aufbau eines Impfschutzes auch beim älteren Hund durchgeführt werden.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Eurican Merilym ist subkutan anzuwenden.  
Impfstoff vor Gebrauch gut schütteln!

Es liegen keine Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit der gleichzeitigen, jedoch ortsgetrennten Anwendung dieses Impfstoffes mit einem anderen vor, mit Ausnahme der Lebendimpfstoffe gegen Staupe und Parvovirose sowie des inaktivierten Impfstoffes gegen Tollwut des gleichen Herstellers. Deshalb wird empfohlen, keine anderen als diese Impfstoffe gleichzeitig, aber ortsgetrennt mit diesem Produkt anzuwenden.

Nicht mit anderen Impfstoffen, immunologischen Produkten oder Tierarzneimitteln mischen.

## **10. WARTEZEIT**

Nicht zutreffend.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren (+2 °C bis +8 °C). Vor Licht schützen. Nicht einfrieren.

Den Impfstoff nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Nur gesunde Tiere impfen, die mindestens 10 Tage vor der Impfung korrekt entwurmt wurden.

Hunde mit früherer klinischer Erkrankung an Borreliose sollten von der Impfung ausgeschlossen werden, da ein Schutz vor möglichen Rezidiven nicht erwartet werden kann. Serologisch positive Hunde ohne frühere Erkrankung können dagegen geimpft werden, da Eurican Merilym vorhandene Feldtiter zu boostern vermag. Es ist jedoch nicht generell erforderlich, vor der Impfung einen Borreliosestest durchzuführen.

Bei versehentlicher Selbstinjektion ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

### **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendete Tierarzneimittel und davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

### **14. DATUM DER FASSUNG DER PACKUNGSBEILAGE**

November 2010

### **15. WEITERE ANGABEN**

Eurican Merilym ist ein inaktivierter Impfstoff mit Adjuvans zur Stimulierung einer aktiven Immunität gegen die durch *Borrelia burgdorferi sensu stricto* verursachte Lyme-Borreliose.

Der Impfstoff kann auch während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

#### **Handelsform**

Packung mit 10 x 1 Dosis (10 x 1 ml)

Verschreibungspflichtig

#### **Für Österreich:**

##### Vertrieb:

Richter Pharma AG  
Feldgasse 19  
A-4600 Wels

Z.-Nr. 8-20179

Abgabestatus: Rezept- und apothekenpflichtig