

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben (Flasche mit 100 ml)



Merial GmbH
Am Söldnermoos 6
D-85399 Hallbergmoos

Gebrauchsinformation

Frontline® Spray

Wirkstoff: Fipronil

Für Tiere (Hunde und Katzen)

Zusammensetzung

100 ml Lösung enthalten:

Fipronil	0,25 g
2-Propanol	62,88 g = 80,0 ml
Copolyvidon	2,00 g
Gereinigtes Wasser	

Darreichungsform und Inhalt

Lösung zum Aufsprühen auf das Fell

Flasche mit Pump-Spray zu 100 ml (1 Pumpstoß = 0,5 ml)

Pharmazeutischer Unternehmer

Merial GmbH
Am Söldnermoos 6
D-85399 Hallbergmoos

Anwendungsgebiete

Zur Bekämpfung des Floh- (*Ctenocephalides* spp.), Zecken- (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) und Haarlingsbefalls (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) bei Hunden und Katzen.

Zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (Flohallergiedermatitis = FAD) bei Hunden und Katzen.

Gegenanzeigen

Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Tiere mit Hautläsionen, besonders im Rückenbereich, sind von der Behandlung auszuschließen.

Aufgrund gelegentlich beobachteter Unverträglichkeiten beim Kaninchen wird die Behandlung dieser Tierart nicht empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Die Behandlung ist in einem gut belüfteten Raum oder, besonders bei der Behandlung mehrerer Tiere, im Freien durchzuführen. Nicht in die Augen und Nase des Tieres sprühen.

Während der Behandlung nicht rauchen, trinken oder essen. Brennbar! Nicht in offene Flammen sprühen. Von der Behandlung noch feuchte Tiere nicht mit offenen Flammen in Kontakt bringen.

Asthmatiker oder Personen mit bekannter Empfindlichkeit gegen Chemikalien und Alkohol sollten Frontline Spray nicht anwenden.

Während der Behandlung wasserdichte Handschuhe tragen und Benetzung der Kleidung vermeiden. Nach der Behandlung Hände waschen und eventuell benetzte Kleidung wechseln und waschen. Sprühnebel nicht einatmen! Haut- und Augenkontakt vermeiden! Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort mit ausreichend Wasser abspülen.

Kinder während der Behandlung und bis zur vollständigen Abtrocknung des behandelten Tieres fernhalten!

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung und Dauer der Anwendung

In Abhängigkeit von der Länge des Fells 3 bis 6 ml/kg KGW (7,5 bis 15 mg Fipronil/kg KGW), z. B. 6 bis 12 Pumpstöße pro kg Körpergewicht.

Mechanischer Pump-Spray zum Aufsprühen der Lösung auf das Fell.

Den ganzen Körper gegen den Haarstrich aus einer Entfernung von 10 - 20 cm so einsprühen, dass das Fell vollständig feucht ist. Vor allem bei langhaarigen Hunden und Katzen erst nach dem Einsprühen mit der behandschuhten Hand bis auf die Haut einmassieren. Nicht trockenreiben, sondern in einem gut belüfteten Raum oder im Freien natürlich trocknen lassen. Durch das Besprühen entsteht ein Film auf den Haaren, der das Fell glänzend macht.

Zwischen 2 Behandlungen soll das Tier nicht öfter als 4mal jeweils im Abstand von 2 Wochen intensiv gebadet oder gewaschen werden.

Frontline Spray wirkt in der angegebenen Dosierung bis zu 3 Monate gegen Flöhe bei Hunden, bis zu 6 Wochen gegen Flöhe bei Katzen sowie bis zu 4 Wochen gegen Zecken und Haarlinge bei Hunden und Katzen. Abhängig vom Infestationsdruck ist eine Wiederholung der Behandlung nach den genannten Zeiträumen empfehlenswert.

In Einzelfällen ist auch nach der Behandlung das Einbohren von Zecken nicht ausgeschlossen. Diese fallen jedoch 24 - 48 Stunden später ab, in der Regel ohne Blut gesaugt zu haben.

Zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie wird empfohlen, den allergischen Patienten sowie andere Hunde und Katzen im Haushalt in monatlichen Abständen zu behandeln.

Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es bei empfindlichen Tieren zu Hautreaktionen unterschiedlicher Intensität kommen, wie Juckreiz und entzündliche Irritationen.

Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

Hinweis

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Brennbar! Vor Hitze geschützt und nicht über +25 °C aufbewahren.

Frontline Spray ist eine brennbare Flüssigkeit der Gefahrklasse B und unterliegt den Vorschriften der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung von nicht verwendeten Arzneimitteln

Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Datum der Fassung der Packungsbeilage

01.09.2001

Eigenschaften und Wirkung

Fipronil ist ein hochwirksames Insektizid und Akarizid aus der Phenylpyrazol-Familie. Seine Wirkung beruht auf einer selektiven Hemmung des GABA-Rezeptors im Zentralnervensystem von Wirbellosen (GABA = Gamma-Aminobuttersäure; GABA ist ein wichtiger hemmender Neurotransmitter).

Nach der Sprayanwendung entsteht durch das Trocknen auf dem Haarkleid ein Fipronil-Film, der dem Fell einen natürlichen Glanz verleiht. Die nach der Sprayanwendung über die Haut absorbierte Menge an Fipronil ist vernachlässigbar gering.